cis-9-Octadecenyl β -D-galactopyranoside (XIV) 上記の如くにして得た *cis*-9-octadecenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl- β -D-galactopyranoside (収率 46%, bp_{0.06} 240°) を用い, 脱アセチル化する. この反応液を活性炭処理した後, MeOH を減圧下に留去. この残渣 4g を Me₂CO・ベンゼン (2:1) の混合溶媒に溶かして, 径 2 cm 長さ 20 cm のアルミナカラムに展開し, さらに同じ混合溶媒約 200 cc を流して未反応物を流出せしめる. 次に EtOH 約 500 cc を流せば, Fehling 反応, エステル検出反応共に陰性で, かつこのものを 10% HCl で加水分解すれば Fehling 反応陽性を示す溶液が流出. この部分を集め, 溶媒を留去し, その残渣を Me₂CO より再結晶. 収率 62%. tp 56°, mp 138°, $[\alpha]_D^{25}$: +3.8 (EtOH). C₂₄H₄₆O₆ 計算値 C 66.93, H 10.76, 実験値 C 67.02, H 10.86.

Alkyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl- β -D-glucopyranoside の合成 (XV~XVIII) galactoside の場合と同様, α -acetobromo-D-glucose とアルコール類とを縮合せしめ, その反応液残渣を, 各アルキルに応じて精製.

Tetradecyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl- β -D-glucopyranoside (XV) 上記の如くにして得た残渣を, MeOH より繰返し再結晶. 収率 52%. 白色針状晶, mp 68.5°~69.0°, $[\alpha]_D^{25}$: -15.1° (CHCl₃). C₂₈H₄₈O₆ 計算値 C 61.74, H 8.89, 実験値 C 61.61, H 8.94.

Hexadecyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl- β -D-glucopyranoside (XVI) 上記の如くにして得た残渣を, リグロインより 4 回再結晶した後, EtOH より繰返し再結晶. 収率 50%. 白色針状晶 mp 72~73.5°, $[\alpha]_D^{25}$: -19.7 (CHCl₃). 文献³⁾と一致.

Octadecyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl- β -D-glucopyranoside (XVII) (XVI) と同様にして得. 収率 42%. 白色針状晶, mp 78.0~79.5°, $[\alpha]_D^{25}$: -21.8 (CHCl₃). C₃₂H₅₆O₁₀ 計算値 C 63.98, H 9.39, 実験値 C 63.90, H 9.50.

cis-9-Octadecenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl- β -D-glucopyranoside (XVIII) 上記の如くにして得た残渣を真空蒸留によつて精製. 収率 58%. bp_{0.05} 252°, C₃₂H₅₄O₁₀ 計算値 C 64.19, H 9.09, 実験値 C 64.11, H 9.24.

Alkyl β -D-glucopyranoside (XIX~XXII) の合成 galactoside の場合と同様にして得.

Tetradecyl β -D-glucopyranoside (XIX) (XI) と同様に (XV) を脱アセチル化し, 精製. 収率 72%. 白色針状晶 tp 82~83°, mp 150°, $[\alpha]_D^{25}$: -32.4 (EtOH). C₂₀H₄₀O₆ 計算値 C 63.80, H 10.70, 実験値 C 63.54, H 10.72.

Hexadecyl β -D-glucopyranoside (XX) (XIX) と同様にして得. 収率 68%. 白色針状晶, tp 82.0~82.5°, mp 145°, $[\alpha]_D^{25}$: -22.7 (EtOH), 文献³⁾と一致.

Octadecyl β -D-glucopyranoside (XXI) (XIX) と同様にして得. 収率 59%. 白色針状晶, tp 80.0~81.5°, mp 120°, $[\alpha]_D^{25}$: -21.8, C₂₄H₄₈O₆ 計算値 C 66.62, H 11.19, 実験値 C 66.32, H 11.08.

cis-9-Octadecenyl β -D-glucopyranoside (XXII) (XIV) と同様にしてクロマト分離した後, 得られた溶液を予め EtOH 浸漬したアンバーライト IR-120 で処理し, 炭処理後溶媒を留去. 収率 37%. 無色アメ状, $[\alpha]_D^{25}$: -15.4 (EtOH). C₂₄H₄₆O₆・H₂O 計算値 C 64.25, H 10.78, 実験値 C 64.38, H 10.69.

京都大学医学部薬学科

UDC 547.837.6.07

22. 橘川郁男: *dl*-N-Methylaurotetanine の合成

Ikuo Kikkawa: Synthesis of *dl*-N-Methylaurotetanine.

(Research Laboratory, Shionogi & Co., Ltd*.)

N-Methylaurotetanine (II), the phenolic aporphine-type base contained in trace amounts in *Litsea cetrata* Bl. of northern European origin, was synthesized in racemic form by the route shown in Chart 1. During the synthesis, a by-product of Pschorr's phenanthrene-cyclization was a substance corresponding to laudanine (XII), a benzyl-isoquinoline-type base.

(Received June 17, 1958)

さきに富田, 橘川¹⁾は防已科植物に属するコウシュウヤク *Cocculus laurifolius* DC. より得られるフェノール性 aporphine 型塩基である laurifoline (I) の *dl* 体の合成に成功したが, laurifoline (I) の monomethyl

* Imafuku, Amagasaki, Hyogo-ken.

1) 富田, 橘川: Pharm. Bull. (Tokyo) 3, 100(1955).

ether 体である N-methylaurotetanine (II)²⁾ は北欧に産するクスノキ科植物に属する *Litsea cetrata* Bl. 中に laurotetanine (III) と共に微量に含有するアルカロイドである。この N-methylaurotetanine は種々の分解反応ならびにその methyl ether (glaucine)³⁾ および ethyl ether^{2,4)} の合成の結果、(II) 式の構造を示すことが決定されたのであるが、今迄にこのフェノール性塩基 (II) の合成は行われていない。

今回著者は N-methylaurotetanine (II) の合成を試み、(II) の *dl* 体、ならびに副反応物として *dl*-lauda-

Chart 1.

2) E. Späth, E.E. Suominen : Ber. **66**, 1344(1933).

3) J. Gadamer : Arch. Pharm. **249**, 680(1911); R.K. Callow, J.M. Gulland, R.D. Haworth : J. Chem. Soc. **1929**, 658.

4) E. Späth, K. Tharrer : Ber. **66**, 583(1933); G. Barger, J. Eisenbrand, L. Eisenbrand, E. Schlittler : *Ibid.* **66**, 450(1933).

nine (XII)^{5,6)} に相当する物質を合成し得た。

dl-N-methylaurotetanine (II) の合成法は既報の laurifoline¹⁾ の合成の場合と同様にフェノール性水酸基 1 個を有するため、最初より benzyl ether として水酸基を保護して合成を進めた。即ち前報の *dl*-menisperine (N-methylisocorydine) の合成原料と同一の 3,4-dimethoxyphenethylamine (IV)⁶⁾ と、*dl*-laurifoline の合成中間体である 3-benzyloxy-4-methoxy-6-nitro- ω -diazoacetophenone (V)¹⁾ とを Arndt-Eistert 法に従い、ベンゼン溶媒中酸化銀触媒にて反応せしめて対応する酸アミドすなわち N-(3,4-dimethoxyphenethyl)-2-(3-benzyloxy-4-methoxy-6-nitrophenyl)acetamide (VI) とした。次いで Bishler-Napieralski 反応により酸アミド (VI) は五塩化リンと共に封管中室温で放置することにより isoquinoline 閉環を行い塩酸塩 (VII) を単離した。塩酸塩 (VII) は希アンモニア水にて遊離塩基 (VIII) とし、沃化メチルと煮沸して methiodide (IX) に導いた。ここに含まれる methiodide (IX) は常法に従い^{1,6)} 希酢酸に溶解し低温において亜鉛末と濃塩酸とを加えて還元を行い生成するアミン (X) は mp 75~77° の結晶として捕捉した。

次に、1-(3-benzyloxy-4-methoxy-6-aminobenzyl)-2-methyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (X) はメタノールに溶解し冷時 10%硫酸同量を加え低温にてジアゾ化を行い、反応液は一旦煮沸してから亜鉛末と濃塩酸とを用いて Pschorr の反応を行つたところ、反応生成体として picrate mp 153~154° (A 物質), picrate mp 159~160° (B 物質), picrate mp 209°(decomp) (C 物質) および少量の mp 167~169° 無色柱晶 (D 物質) の 4 種を結晶として単離した。picrate mp 153~154° (A 物質) よりの遊離塩基 (XI) は紫外外部吸収スペクトルにより amino 基の離脱して得られる benzyloquinoline 型塩基特有の吸収 (Fig. 1 (a)) を示し、この (XI) 物質を塩酸で脱ベンチル化すると文献記載の *dl*-laudanone (XII)^{5,6)} の性状に全く一致する物質が得られた。次に picrate mp 159~160° (B 物質) よりの遊離塩基は mp 82~83° を示し、紫外外部吸収スペクトルでは benzyloquinoline 型塩基特有の吸収を示すが、赤外部吸収スペクトルでは hydroxyl 基の吸収を示しておらず、従つてこの遊離塩基を塩酸と加熱したが変化しない。本物質は前報の *dl*-menisperine 合成の時、Pschorr 閉環の際得られた mp 82~83° の物質⁶⁾ と性状はよく一致し、また混融比較するも融点降下せず、同一物質が得られたものと思われるが、物質少量のためこれ以上は精査することが出来なかつた。次いで picrate mp 209°(decomp) (C 物質) よりの遊離塩基 (XIII) は mp 119~121° を示し、紫外外部吸収スペクトルにより phenanthrene 閉環が進行して得られる aporphine 型塩基特有の吸収 (Fig. 1 (b)) を示し、塩酸で脱ベンチル化を行うと無晶形の物質⁷⁾ (II) が得られ種々結晶化を試みるも結晶し難く mp 212°(decomp) の修酸塩として捕捉した。この遊離塩基 (II) も紫外外部吸収スペクトルでは aporphine 型塩基特有の吸収を示し、また赤外部吸収スペクトルにより hydroxyl 基および NCH₃ 基が確認され、過クロール鉄溶液に呈色し、また濃硫酸あるいは濃硝酸に対する呈色反応は一般の aporphine 型塩基の呈色反応によく一致している。なお天然の *d* 体が入手出来なかつたが、以上の性状より N-methyl-aurotetanine (II) の *dl* 体に相当する物質が合成し得たのである。次に mp 167~169° 柱晶 (D 物質) は紫外外部吸収スペクトルでは aporphine 型塩基によく似た吸収 (Fig. 1 (c)) を示しているが、一般の aporphine 型塩基に比べて短波長の方へ吸収がずれており、赤外部吸収スペクトル、分子量および分析値よりも目的

Fig. 1. Ultraviolet Absorption Spectra
(in 95% EtOH)

- (a) (XI)
- (b) (XIII)
- - - (c) mp 167~169° 柱晶 (この場合は縦軸のスケールは任意である)

5) R. H. F. Manske, H. L. Holmes: "The Alkaloids" IV, 59(1954).

6) 橘川: 本誌 78, 1006(1958).

7) 天然の *d*-N-methylaurotetanine (II) も結晶しない²⁾.

物に一致せず, Pschorr 閉環の際に副反応物として生じたものと思われる. なお物質微量のためこれ以上精査出来なかつた.

終りに臨み本研究は京都大学薬学科富田教授の御指導により実施したものでありここに厚く御礼申し上げる. なお本研究の便を賜つた当研究所長武田健一博士, 並びに種々御助言を賜つた浜元 要研究員, 赤外部及び紫外部吸収スペクトルの測定の労をとられた松井, 宮崎の諸氏, 又元素分析室の諸氏に併せて感謝の意を表する.

実 験 の 部†

N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-2-(3-benzyloxy-4-methoxy-6-nitrophenyl)acetamide (VI) 3-benzyloxy-4-methoxy-6-nitro- ω -diazoacetophenone (V)¹⁾ 9.3 g をベンゼン 200 cc に溶解し, 60~65° に保ち, よく攪拌しつつ 3,4-dimethoxyphenethylamine (IV)⁶⁾ 5.5 g を加え, 次いで新たに製した Ag_2O 2 g を少量ずつ加えんと烈しく発泡反応. 全部加えた後 65° に 2 時間攪拌し更に Ag_2O 2 g を追加して 30 分間煮沸後, 活性炭を加えて温時濾過. 濾液を濃縮すれば結晶が残留. EtOH より再結晶, mp 165° 黄色針晶 (VI) 8.3 g を得. $\text{C}_{26}\text{H}_{28}\text{O}_7\text{N}_2$ 計算値 C 65.00, H 5.87, N 5.70, 実験値 C 64.87, H 5.99, N 5.93.

1-(3-Benzyloxy-4-methoxy-6-nitrobenzyl)-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride (VII) 酸アミド (VI) 4 g, 無水 CHCl_3 25 cc, PCl_5 8 g の混合物を封管に入れ 4 日間室温 (15~20°) 放置し, 次に開管して 4 時間室温放置後, 反応物を氷上に注加し 30° 以下に保ちつつ CHCl_3 , POCl_3 を留去. ここに析出せるゴム状物質を分離し冷水で洗浄後よく水を切つてから MeOH 50 cc に溶解し, 次いでこれに conc HCl 2 cc を加え水浴上煮沸して析出物を全部溶解後, 活性炭を入れて熱時濾過. MeOH を殆んど留去後, これにエーテルを加えて冷所にて一夜放置すると結晶析出. MeOH より再結晶. mp 223~224°(decomp) 淡黄色針晶 (VII) 3 g を得. $\text{C}_{26}\text{H}_{26}\text{O}_6\text{N}_2 \cdot \text{HCl}$ 計算値 C 62.58, H 5.45, N 5.62, 実験値 C 62.31, H 5.62, N 5.72.

1-(3-Benzyloxy-4-methoxy-6-nitrobenzyl)-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline methiodide (IX) 上記の塩酸塩 (VII) 1 g を MeOH 20 cc に溶解し, 氷水にて冷却しつつ 1% NH_4OH にてアルカリ性となれば結晶析出. これを熱 MeOH より再結晶. mp 174~176° 淡黄色針晶 (VIII) を得. $\text{C}_{26}\text{H}_{26}\text{O}_6\text{N}_2$ 計算値 C 67.52, H 5.67, N 6.06, 実験値 C 67.64, H 5.77, N 5.89. 斯くして得た遊離塩基 (VIII) を少量の CHCl_3 に溶解し過剰の CH_3I と 6 時間煮沸後, 溶媒を留去すると油状物質を得. これを MeOH より再結晶. mp 190°(decomp) 黄色板晶 (IX) 1 g を得. $\text{C}_{26}\text{H}_{26}\text{O}_6\text{N}_2 \cdot \text{CH}_3\text{I} \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 計算値 C 52.86, H 4.93, N 4.57, 実験値 C 52.88, H 5.68, N 4.28.

1-(3-Benzyloxy-4-methoxy-6-aminobenzyl)-2-methyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (X) methiodide (IX) 4 g を AcOH 100 cc に溶解し, これに水 25 cc を加えてから冷時 conc HCl 100 cc を加え 0~2° に保ちよく攪拌しつつ Zn 末 25 g を少量ずつ加え, 全部加え終つてから更に 7 時間攪拌を継続すれば反応液は全く無色となる. これを濾過し濾液に水 100 cc を加え 15° 以下に保ちつつ 5% NH_4OH にてアルカリ性とする. 析出せるゴム状物質は CHCl_3 抽出を繰返し無水 K_2CO_3 にて乾燥後溶媒を留去すると黒褐色結晶物質が残留. これを少量の熱 EtOH に溶解し活性炭を入れ温時濾過. 放冷すると結晶析出. 本物質を EtOH より再結晶. mp 75~77° 淡黄色柱晶 (X) 2.1 g を得. $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_4\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 計算値 C 69.50, H 7.35, N 6.00, 実験値 C 69.73, H 7.36, N 6.24. U.V. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ 290 m μ ($\log \epsilon$ 3.80). dipicrolonate: EtOH· Me_2CO 混液より再結晶. mp 193~194°(decomp) 黄色細針晶 $\text{C}_{27}\text{H}_{32}\text{O}_4\text{N}_2 \cdot 2\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_5\text{N}_4$ 計算値 C 57.78, H 4.95, N 14.34, 実験値 C 57.34, H 5.20, N 13.98.

dl-N-Methyl-laurotetanine (II) 及び dl-laudanine (XII) 上記の amino-benzyltetrahydroisoquinoline (X) 2 g を MeOH 40 cc に溶解し, 冷時 10% H_2SO_4 40 cc を加えて 0° に保ち攪拌しつつ, N NaNO_2 溶液 (NaNO_2 0.37 g) を滴下しジアゾ化反応 6 時間行う. 黄褐色を帯びたる反応液は 30 分間煮沸するとブドウ紅色を呈し, これに Zn 末 2.5 g, conc HCl 5 cc を加えて再び 15 分間煮沸すると反応液は殆んど無色となる. 温時濾過し酸性濾液は冷後 Et_2O で洗浄後, 15° 以下に保ち 10% NH_4OH にてアルカリ性とし, CHCl_3 抽出を繰返す. CHCl_3 抽出液は水洗後, 無水 K_2CO_3 乾燥, 次いで CHCl_3 を留去すると黒褐色油状物質を得. この油状物質は石油エーテル (bp 40~60°)・ベンゼン等量溶液にて Al_2O_3 層を通過せしめると最初の流出分より無色粘稠なる油状物質を得. picrate: $\text{Me}_2\text{CO} \cdot \text{MeOH}$ 混液より再結晶, mp 153~154° 黄色板晶 (A 物質) 0.15 g と, 少量の mp 159~160° 黄色柱晶 (B 物質) 80 mg を得. 次いで Al_2O_3 層をベンゼンで流出せしめ, 無色油状物質を得. picrate: Me_2CO より再結晶. mp 209°(decomp) 黄色プリズム晶 (C 物質) 0.25 g を得. ベンゼンにて流出しつくせる Al_2O_3 層は最後に 20% Me_2CO 含有のベンゼンにて流出すると無色結晶様物質を得. ベンゼンより再結晶. mp 167~169° 無色針状晶 (D 物質) 70 mg を得.

こうして得られた picrate mp 153~154° (A 物質) よりの遊離塩基 (XI) は石油エーテル (bp 40~60°) より再結晶. mp 90° の無色柱晶を得. $\text{C}_{27}\text{H}_{31}\text{O}_4\text{N}$ (遊離塩基) 計算値 C 74.80, H 7.21, N 3.23, 実験値 C 74.38, H 7.34, N 3.16. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ 282 m μ ($\log \epsilon$ 3.86) (Fig. 1 (a)). $\text{C}_{27}\text{H}_{31}\text{O}_4\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$ (picrate) 計算値 C 59.81, H 5.17, N 8.45, 実験値 C 59.50, H 5.23, N 8.44. この遊離塩基 (XI) を 20% HCl 30 倍量と水浴上 1 時間

† 融点はすべて未補正

加熱後、減圧にて濃縮乾固し、残留分を少量の水に溶解して飽和 NaHCO_3 水でアルカリ性とし CHCl_3 抽出。 CHCl_3 抽出液は無水 Na_2SO_4 にて乾燥後 CHCl_3 を留去すると無色油状物を得。これを $\text{CHCl}_3 \cdot \text{Me}_2\text{CO}$ 混液より再結晶。mp $166 \sim 167^\circ$ 無色短柱晶 (XII) を得。 $\text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{O}_4\text{N}$ 計算値 C 69.94, H 7.34, N 4.08, 実験値 C 69.82, H 7.55, N 4.24. U.V. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ 283 m μ (log ϵ 3.94). FeCl_3 溶液にて緑色に呈色し、また conc H_2SO_4 には桃色に溶解しこれを 150° に加熱すると紫色に変ずる。本物質 (XII) は前報⁹⁾ に於いて得た *dl*-laudanine (mp $166 \sim 168^\circ$) と混融するも融点降下せず。その他本物質の性状は文献⁹⁾ 記載の laudanin (XII) の性状に全く一致する。

次に picrate mp $159 \sim 160^\circ$ (B 物質) よりの遊離塩基は石油エーテル (bp $40 \sim 60^\circ$) より再結晶。mp $82 \sim 83^\circ$ の無色針晶を得。U.V. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ 283 m μ . 実験値 (picrate) C 49.55, H 5.04, N 12.75, (遊離塩基) C 66.90, H 8.75, N 6.03. 本遊離塩基は前報⁹⁾ に於いて得た mp $82 \sim 83^\circ$ の物質と赤外部吸収スペクトル及びその性状はよく一致し、また混融するも融点降下せず、物質微量のため更に追求精査出来なかつた。

次に picrate mp 209° (decomp) (C 物質) よりの遊離塩基 (XIII) は少量の Me_2CO 含有の石油エーテル (bp $40 \sim 60^\circ$) より再結晶。mp $119 \sim 121^\circ$ の無色針晶を得。U.V. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ 280, 303 m μ (log ϵ 4.23, 4.20) (Fig. 1 (b)). $\text{C}_{27}\text{H}_{29}\text{O}_4\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}$ (picrate) 計算値 C 60.00, H 4.88, N 8.48, 実験値 C 59.90, H 5.10, N 8.62. $\text{C}_{27}\text{H}_{29}\text{O}_4\text{N}$ (遊離塩基) 計算値 C 75.11, H 6.77, N 3.25, 実験値 C 74.66, H 6.87, N 3.37. 本遊離塩基 (XIII) は 20% HCl 30 倍量と水浴上 1 時間煮沸後、減圧にて濃縮乾固し残留分は少量の水に溶解して分液ロートに移し上層に Et_2O を張り 15° 以下に保ち飽和 NaHCO_3 水にてアルカリ性とし Et_2O 抽出を繰返す。抽出液は無水 Na_2SO_4 にて乾燥。 Et_2O を留去すると無色無晶形の物質 (II) が得られ、本物質は種々結晶化を試みるも結晶し難く、oxalate とし $\text{Me}_2\text{CO} \cdot \text{MeOH}$ 混液より再結晶。mp 212° (decomp) の無色柱晶を得。 $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{O}_4\text{N} \cdot (\text{COOH})_2$ (oxalate) 計算値 C 61.24, H 5.85, N 3.25, 実験値 C 61.28, H 6.35, N 3.14. U.V. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ (遊離塩基) 281, 303 m μ (log ϵ 4.11, 4.09), (oxalate) 282, 303 m μ (log ϵ 4.13, 4.16). I.R. $\lambda_{\text{max}}^{\text{CHCl}_3}$ 2.81 (OH), 3.56 (NCH_3) μ . 本物質 (II) は FeCl_3 溶液にて黒緑色に呈色し、conc HNO_3 には赤色に溶解し直ちに orange red を経て長時間後に淡黄色に変ずる。また conc H_2SO_4 には紫色に溶解し加熱すると赤褐色を経て青色に変色し、この溶液に conc HNO_3 1 滴を加えると orange red を経て淡黄色に変ずる。

次に mp $167 \sim 169^\circ$ 無色柱晶 (D 物質) は FeCl_3 溶液には殆んど呈色しないが、conc H_2SO_4 では淡黄褐色を呈し加熱すると淡赤色を経て濃赤褐色に変ずる。Rast 法による分子量 (camphor) 241.5. 実験値 C 70.22, H 5.85, N 11.04, 10.86, O 11.94, OCH_3 12.02. U.V. $\lambda_{\text{max}}^{95\% \text{ EtOH}}$ 260, 294 m μ . I.R. $\lambda_{\text{max}}^{\text{CHCl}_3}$ 2.88, 3.52, 6.11, 6.71, 7.40, 7.64 μ . なお物質少量のためこれ以上精査出来なかつた。

塩野義製薬株式会社研究所