特集●骨粗鬆症と腰痛

骨粗鬆症の腰背痛と画像所見

佐藤 光三¹⁾ 石河 紀之²⁾

Key words 骨粗鬆症 (Osteoporosis), 腰背痛 (Back pain), 画像所見 (Imaging)

要旨：骨粗鬆症患者の急性腰背痛は主として圧迫骨折に起因し、慢性腰背痛は後弯による筋筋膜性疼痛が多い。圧迫骨折のMRIはT1で低輝度、T2で高輝度を示し、新鮮骨折の描出に鋭敏であるのでX線写真で骨折と判断しがたい場合特に有用性が高い。偽関節は慢性疼痛の原因となり、そのX線像では骨折線が前屈位で縮小ないしは消失し伸展位で拡大する。MRIではT1低輝度、T2高輝度と明瞭化する。Gd造影所見は骨折椎のviabilityを反映するので骨癒合の予後判定にも役立つ。したがって、圧迫骨折の治療では、MRIを参考にして体幹ギプスのような強固な外固定を行うことにより高い癒合率が得られる。また、単純X線写真での骨硬化像の出現はMRIの正常化より早く、しかも腰背痛の経過を反映しやすい。

Summary

In osteoporotic patients acute and severe back pain usually originates from vertebral compression fractures, and chronic one most commonly from an alteration in the supporting mechanism of the spine caused by vertebral body fractures. On MR images the signal intensity of the fractured vertebral bodies generally alter low on T1WI and high on T2WI in the acute phase. This changes in signal intensity are so highly sensitive to detect an additional fresh vertebral fracture in a patient with many prevalent vertebral deformities. Nonunion of vertebral body fracture is one of the causes of chronic back pain in osteoporotics, and it is likely to occur by an inadequate management in the acute phase of a fracture. A fracture line of nonunion is more readily recognized on extension x-ray films of the spine, and MR images also clearly demonstrate nonunion as a low signal intensity area on T1WI and definitely high on T2WI. Gd-enhancement is also useful to evaluate viability of the fracture site, and to predict the fracture healing process. Accordingly, osteoporotic vertebral body fractures are successfully treated by an adequate external fixation devices including a body cast and/or a long brace with reference to MR images additionally to X-ray findings.

Kozo SATO *et al*: Back pain and its related imaging in osteoporotic patients.

¹⁾ 医療法人松田会松田病院整形外科〔〒981-3217 仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1〕

²⁾ 秋田労災病院整形外科（現 秋田赤十字病院整形外科）

はじめに

骨粗鬆症の脊椎圧迫骨折は、急性腰背痛を起し、残存した椎体変形は脊柱後弯を続発させ、それに関連して慢性腰背痛が発生しやすい。後弯が高度な患者は、脊柱の機能障害のみならず内臓諸臓器の機能障害のためQOLが低下する⁶⁾。ここでは、骨粗鬆症患者における腰背痛とそれに関連する画像所見についてのべる。

・脊椎骨粗鬆症患者の腰背痛

腰背痛には急性疼痛と慢性疼痛とがあり、急性疼痛は主として脊椎圧迫骨折で起こる。骨折による疼痛は骨折部より遠位に自覚され、しばしば関連痛として体側部へ放散するので注意を要する⁹⁾。また、骨折による局所の後弯がある程度以上強まると、椎間関節に無理が生じて関節性疼痛が起こり得る。慢性疼痛は、偽関節や脊柱後弯に関連して起こりやすい。後弯により脊柱の支持機構が弱化し、筋筋膜の過緊張による筋筋膜性疼痛、胸椎後弯や腰椎前弯増強による椎間関節性疼痛、同じく腰椎前弯増強によるkissing spine、後弯の高度化につれて胸郭が骨盤腔に接して起こるcosto-iliac impingement syndromeなどがあり、なかでも筋筋膜性疼痛が圧倒的に多い。また、破裂型骨折による腰痛や神経麻痺が稀に発生する。

脊柱後弯の程度は、脊柱の立位側面X線像について第4胸椎から第12胸椎、または後弯と前弯の移行椎間で計測する。後弯の角度による定義は現在のところ確定していないが、筆者ら⁶⁾は、第4胸椎から第12胸椎までの角度が45度以上のものを明らかな後弯としている。

・脊椎圧迫骨折の画像所見

骨粗鬆症の診療においてX線写真に加えてMRIの有用性が明らかとなってきた。

1. 単純X線所見

1) 圧迫骨折の種類と定義

圧迫骨折はその形態から楔状椎、陥凹椎(魚椎)、扁平椎とに分類される。しかし、それらは同一椎体でも同一脊柱でも複合して発生し、脊椎レベルにより起こりやすい形態がある。すなわち、楔状椎は椎間板が薄い胸椎から胸腰椎移行部に、陥凹椎は椎間板が豊富で膨隆しやすい腰椎に多い。したがって、これらの形態に特にとらわれずに圧迫骨折と一括する視点もある⁷⁾。わが国の原発性骨粗鬆症診断基準では、椎体前縁高が後縁高の0.75以下、また、椎体中央部の高さが椎体前縁や後縁の高さの0.8以下の場合圧迫骨折による椎体変形、すなわち形態的骨折としている⁸⁾。しかし、疼痛を訴える臨床的骨折はこの判定基準に満たない場合も少なくなく、その際は、さらに外傷の有無や局所所見を加味し、また、X線像で皮質骨の断裂像等の特異的所見があれば骨折と判定するとしている¹⁰⁾。骨折当初形態的に骨折が判然としない場合は、骨折を質的にも描出できるMRIが有用であり、また、1～2週後にX線像で椎体変形が明瞭化する場合もあるので再度のX線撮影が重要である。なお、米国では、椎体の高さが椎体後縁高の20%以上減少するか、対象とする椎体高が平均値の3SD以上減少すれば形態的骨折としているようである⁷⁾。また、ある観察期間においてX線写真上椎体高が20%以上あるいは4 mm以上減少した場合は新規に発生した骨折と判断している¹¹⁾。

2) 偽関節

偽関節は慢性腰背痛の原因の一つである。骨折初期の不適切な処置により発生しやすい。単純X線写真では骨折部に一致して椎体内に横走る透亮像がみえる。それは前屈位で縮小または消失し、後屈位で開大し明瞭化する。MRIではT1強調画像で低輝度、T2画像で著明な高輝度となり容易に判断できる。

骨折が椎体の後部まで及び、かつ血流が乏しいと椎体は徐々に圧潰し、骨折片が脊柱管内に突出して神経症状を起こしやすい。この場合、偽関節になっていることが多い。本骨折形態は外傷性破裂骨折に相当するので、破裂型骨折(burst-type fracture)または骨粗鬆症性破裂骨折ともいえよう。扁平椎と形態的には類似するが、麻痺症状の有無で区別され形態的にも両者間に差異があるとの報告がある⁵⁾。

偽関節は胸腰推移行部でしかも椎体後壁も破断する不安定な扁平椎に起こりやすい。扁平化した椎体は隣接椎体の側面と接触し安定化することが多くみられる。しかし、このためには長期間の外固定が必要である。

3) 仮骨形成と腰痛の関連性

骨折部に仮骨が形成され、X線上雲絮状の骨硬化像が出現し、腰背痛も軽快する。ステロイド誘発性骨粗鬆症では、骨癒合が遷延するためその間に他の椎体が骨折し複数の椎体に骨硬化像がみられることが一つの特徴とされている。したがって、この疾患での骨硬化像は良好な骨癒合のサインとはいえない。事実、疼痛はこの時期でも継続する。最近、退行期骨粗鬆症でもステロイド骨粗鬆症と同様に複数の椎体に骨硬化像がみられる例が散見される。それは、骨粗鬆症患者の高度高齢化により短期間に複数の骨折が連続して発生す

るためと考えられる。

2. MRI所見

MRIは骨粗鬆症診療上有用なツールであり、T1、T2強調画像、Gd造影像が用いられる。

1) 特徴的所見とその経過

新鮮骨折の多くはT1で低輝度、T2で高輝度を示すが、T1低輝度、T2も低輝度か等輝度を示す症例が少なくない²⁾。T2でも低輝度となるのは、骨折により海綿骨が圧縮され骨質が高密度になるためと考えられる。すでに複数の椎体変形がある症例の新規骨折は、X線写真では判断しがたいがMRIで容易であることが少なくない。

MRIの異常所見は、骨折後3～6カ月で正常化するとされる。しかし、骨折治癒が遷延するとT2高輝度が持続し、特に高い輝度は偽関節を示唆する。偽関節では、後屈位X線像で骨折線が開大し、その部分は著明なT2高輝度となる。破裂型骨折は偽関節所見を示すものが多い。

2) 造影所見の有用性

Gd造影像が骨のviabilityを表すとされるので、石河ら³⁾は、造影像を3型に分類し、椎体全体が造影されるものをⅠ型、骨折線部に限局した非造影部分をもつものをⅡ型、骨折線以外にも広範に非造影部分を示すものをⅢ型とした(図1)。Ⅰ型では治癒が遷延しやすいのでギプスの固定期間を長くしている。一般に骨折後1～3カ月で骨折部全体が造影されれば、それは骨癒合の良好な予後を意味するという。逆に遷延治癒例では6カ月後も非造影部分が残存する。

3) 腰痛の経過とMRI所見の関連性

骨折による腰痛は一般には1～2カ月で軽快する⁹⁾。石河ら³⁾は、骨折後3～7週で仮

非造影影がない例

非造影影が限局している例

非造影影が広範な例

図1 圧迫骨折初期のGd造影所見による分類

型は椎体全体が造影されるもの、型はX線写真の骨折線部に限局した非造影部分をもつもの、型は骨折線以外にも椎体内に広範に非造影部分を呈するものと3型に分類している³⁾。

骨が形成され痛みはこの時点で軽快するとしている。このように、腰痛の経過はMRI所見の正常化よりも早く、むしろX線像と関連するようである。

・圧迫骨折の保存療法での画像所見

これまで述べた圧迫骨折の画像所見を、筆者の一人である石河らが行った保存療法の成績とともに紹介する。症例は平均年齢67歳(58～83歳)の女性15名で後弯変形は最高が23度と高度後弯例は含まれていない。受傷椎はT12が5例、L1が7例、L2が3例である。MRIでT1低輝度は15例全例、T2高輝度も15例全例であった。Gd造影は10例に施行し、

型が3例、型が5例、型が2例であった。治療は体幹ギプス固定とそれに引き続く装具療法である。受傷からギプス着用までは 6.5 ± 4.8 (SD)日であり、ギプスは体幹を伸展させて装着し、装着期間中は入院の上観察

した。ギプス装着後まもなく疼痛は軽減した。造影MRIで非造影部分が1カ月くらいで縮小または消失するので、ギプス固定期間は約1カ月を目安として装着したが、非造影部分の広範な症例では長めとした。その後、軟性装具を仮骨形成が十分みられるまでを目安として装着した。表1にギプスや装具の装着期間、仮骨出現と仮骨が均一化する時期を示した。治療後の骨折椎の楔状変形率は60%強、後弯角も約15度といずれもギプス装着時と特に変わらず軽度の後弯位となった。4カ月後には全例が骨癒合した。

・手術的対応

偽関節のみならず扁平椎にも椎弓根経由あるいは非経由で人工骨やバイオアクティブ骨セメントで補強する椎体形成術(vertebroplasty)が普及しつつある。欧米では通常の圧迫骨折にも経皮的に椎弓根経由でverte-

表1 保存療法の状況

ギプス装着期間	24.0 ± 15.5 日
装具装着期間	53.8 ± 15.4 日
骨梁反応出現時期	38.1 ± 14.0 日
骨梁反応完成時期	69.1 ± 12.0 日

(± SD)

broplastyを行い、最近ではバルーン(inflatable bone tamp)を椎体内に挿入して膨らませて空隙を作り、そこにメチルメタアクリレートを充填する kyphoplasty の有用性が検証されている⁴⁾。

長期間を要する外固定は高齢者の負担が少なくないので、低侵襲で外固定を必須としない手術的治療の出現は、骨粗鬆症治療の一つのエボックともなり得るので期待したい。

おわりに

1) 骨粗鬆症患者の急性腰背痛は主として圧迫骨折に起因し、慢性腰背痛は後弯による筋筋膜性疼痛が多い。

2) MRIは新鮮骨折の描出に鋭敏でありX線写真で骨折と判断しがたい場合特に有用である。Gd造影所見は罹患椎の viability を反映し骨癒合の予後判定にも役立つ。

3) 単純X線写真の骨硬化像出現はMRIの異常信号強度の正常化より早く、腰背痛の経過をより反映しやすい。

4) 圧迫骨折は、MRI所見を参考にしながら強固な外固定などで管理することにより高い骨癒合率が得られる。

文 献

- 1) Black, D.M., et al. : Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Lancet, 348 : 1535-1541, 1996.
- 2) Cho, T., et al. : MRI findings on healing process of vertebral fracture in osteoporosis. J. Orthop. Sci., 1 : 16-33, 1996.
- 3) 石河紀之ほか：骨粗鬆症の胸腰椎移行部圧迫骨折 造影MRIと体幹ギプス固定．東日本整災会誌, 11 : 246-250, 1999.
- 4) Lieberman, I.H., et al. : Initial outcome and efficacy of kyphoplasty in the treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures. Spine, 14 : 1631-1638, 2001.
- 5) 村井 肇ほか：骨粗鬆症に伴う扁平椎の臨床像．Osteoporosis Jpn., 3 : 167-169, 1995.
- 6) 村井 肇ほか：脊椎骨粗鬆症の脊柱変形とQOL. Osteoporosis Jpn., 9 : 477-479, 2001.
- 7) National Osteoporosis Foundation Working Group On Vertebral Fractures : Report-Assessing vertebral fractures. J. Bone Mineral Research, 10 : 518-523, 1995.
- 8) 日本骨代謝学会骨粗鬆症診断基準検討委員会：原発性骨粗鬆症の診断基準（1996年度改訂版）．Osteoporosis Jpn., 3 : 669-674, 1995.
- 9) 佐藤光三ほか：脊椎骨粗鬆症における脊柱変形と腰背痛の検討．整・災外, 28 : 679-686, 1985.
- 10) 吉田 徹：骨粗鬆症性脊椎骨折の早期診断と治療．西日本脊椎研究会誌, 20 : 150-154, 1994.

*

*

*