有機アルミニウム化合物の合成と応用

Syntheses and Applications of Organo Aluminium Compounds

Mülheim Chemistry の最近の発展

Recent Development of the Mülheim Chemistry

大 塚 齊 之 助*

Seinosuke ŌTSUKA

I. Aluminium trialkyl と alkylhydride の合成

Lithium alkyl の熱分解の研究中¹⁾に lithium hydride に olefine が付加する反応が発見された²⁾。この反応は当時出現した LiAlH_4 に応用され³⁾ ついで第3属の Al に移されたのである。すなわち AlH_3 に olefine が付加して AlR_3 を生成する反応の発見となった³⁾。

この反応はその後 Ziegler Chemistry (Mülheim Chemistry という呼び方を Ziegler 教授自身は好む) が大きく発展するその出発点となった重要な反応であるが当時実用的な意味はほとんどなかった。というのは AlH_3 を作るのに次のような高価な反応を要したからである。

Aluminium trialkyl の実用的な合成法の実現には非常な努力が払われ数々の方法が考案された⁴⁾。1955 年になってついに画期的ないわゆる“直接法”が発表された⁵⁾。

AlEt_3 と粉末の aluminium をまぜ 100~200 atm の水素と 120°C に加熱すると AlHEt_2 を生ずる。

これに ethylene を 70~80°C で作用させると AlEt_3 が得られる。

この2式を総合すると

この反応は余り小規模でないほうがよいと云う。 Mül-

heim では 100 l/day の pilot plant が運転されて好成績をおさめている。円筒形の反応塔に 50 l の AlEt_3 を入れ aluminium 末を炭化水素系の溶媒に suspension したものを下から、水素を中間から圧入、120°C で反応させる。塔の上から AlHEt_2 を取り出し第2の塔で ethylene と 60~70°C で反応させる。下から取り出す AlEt_3 は再び第1の塔の上からもどしてやる。この方法によれば AlEt_3 を取出すことも、また AlHEt_2 を取出すこともできる。

AlEt_3 以上の高級の aluminium trialkyl はいわゆる“追出し反応”によって $\text{Al}(\text{isobutyl})_3$ と相当する olefine からつくることができる。実験室的には後述のように AlH_3 を利用する方法がある。

AlMe_3 は別の方法によらねばならぬ。たとえば MeI と Al の反応生成物を分留塔にかけて最も低沸点部である Al_2Me_6 を塔上から取る方法⁶⁾がある。Ziegler らは次の方法を考案した。 AlMe_2Cl に NaF を作用させると AlMe_2F となる。これと NaF を特別の ball mill を使って沸騰 toluene 中で反応させると complex, $\text{Na}[\text{AlMe}_2\text{F}_2]$ が得られる。これを 250~300°C で熱分解するのである⁷⁾。これは今のところ大きな scale でつくるのに適する唯一の方法といえる。

AlMe_3 は benzene 中で dimer である⁸⁾。X 線結晶解析によってこの dimer (mp 15°C) の興味ある bridge structure が明らかにされている⁹⁾。この dimerization の原因は Al が sp^3 tetrahedral structure をとろうとする傾向による。

Al-C-Al 結合は2つの Al の sp^3 orbital と1つの C

*日本合成ゴム K K (東京都中央区京橋 1-1 B・S ビル)

の sp^3 orbital の overlap によってできていると見なされる。したがって Al-C-Al 角は 70°C と比較的狭く、Al と Al との距離は $2.55 \text{ \AA}$ と引きよせられている。これは Al-Al 単結合の距離 $2.52 \text{ \AA}$ に近い。Al₂Me₆ の monomer への解離熱は $20.2 \text{ kcal}^{19)}$ とかなり大きいこともうなずける。diborane 同様この electron deficient structure は興味ある問題である。AlEt₃ は benzene などの non-polar な溶媒中ではやはり dimer だがその association の度は弱くなり vapor では容易に monomer になる。Al (isobutyl)₃ になると monomer のみとなる。

この傾向と一致してたとえば下式のような acetylene への付加は Al(isobutyl)₃ は AlEt₃ よりはるかに早い¹¹⁾。

また ethylene との反応は次の順に遅くなる¹¹⁾。

この最後の AlMe₂Cl は vapor でも dimer となっている。次の構造が X線解析で確められている¹³⁾。

この場合 Al の sp^3 orbital はみたされている。上の3者のうちでは最も反応速度が遅いのは当然であろう。1937年に Hall と Nash が AlEt₂Cl を用いて ethylene を 200°C で作用させ olefine polymer の混合を得ている¹³⁾。彼らの仕事はこの畑での先駆というべきものだが、不幸にして AlEt₃ に比して 200 倍も遅い¹⁴⁾ AlEt₂Cl を用いたのであった。AlR₃ に対する donor としては Cl は弱いほうである。ether ははるかに強く coordinate する。AlR₃OEt₂ の安定なことはよく知られている。したがってたとえば ether 中で AlCl₃ と RNa から AlR₃ をつくろうとすればその etherate が得られることになる。etherate から ether free の AlR₃ をつくことは困難なようである。AlR₃ と olefine の反応に対する ether の強い阻害作用¹⁵⁾もよく知られていることである。ついでながら Grignard 化合物の ether free のものをつくることは可能である。Ziegler らは沸騰 toluene を用いてつくっている¹⁶⁾。Amine は donor として ether より強く AlR₃ に coordinate するはずであるが定量的に比較する data はない。ただし同族の boron について次のことがわかっている。すなわち Me₃B·NR₃ は安定で低級 amine のものは蒸留できる。だが BMe₃ では安定な etherate は存在しない。このことはまた aluminium より boron のほうが acceptor としての性質が弱いことを意味する。

次に aluminium hydride 類について記す。AlHET₂

は前述のように直接合成される。そのほかの AlHR₂ は相当する AlR₂Cl の Na あるいは NaH による還元¹⁷⁾、また AlR₃ の LiAlH₄ による還元でもつくられる¹⁸⁾。AlH₂Et は次の route でつくられる¹⁹⁾。

AlH₃ の製法は次の反応によって実用的なものに近づいた²⁰⁾。

AlEt₂Cl は真空蒸留できるから、これを蒸留で除くとあとに固体の AlH₃ が残る。コン跡の AlEt₂Cl が含まれるが通常の目的には差支えない。上式で生成する AlEt₂Cl は衆知の通り olefine 重合の重要な触媒の一つである。したがってこのほうの需要があれば AlH₃ が安価にできることを意味する。Mülheim ではこの利用の開拓に努力が払われている。難点は不安定なことで 80°C 以上になると分解が始まる。また空気にふれると烈しく発火することである。しかし pentane, hexane などの溶媒中に室温で長く貯えることができる。AlH₃ の還元作用はだいたい LiAlH₄ と同じである。Carbonyl 化合物の還元は LiAlH₄ よりさらに収率のよい場合があるという。また興味ある aluminium triamide, Al(NH₂)₃ が NH₃ との反応でつくられるであろう²²⁾。AlH₃ は実験室的に AlR₃ をつくるのに適している。365 ページに記した反応は通常 $60\sim 80^\circ\text{C}$ で進む。Al-R がさらに olefine に付加するいわゆる“組立て反応”は一般に 120°C 以上でおこる。また“追出し反応”も同様に高温でおこるからこれらの副反応の心配はない。ただし olefine によっては、ことに β 位に枝のあるものでは次の平衡を考慮する必要があるだろう。

次のような例の 110°C の平衡の組成が測定されている²⁰⁾。

AlH₃ の alkali complex の olefine との反応は AlH₃ 自身よりも遅い、あるいは高温を要する。たとえば LiAlH₄ は $110\sim 120^\circ\text{C}$ で olefine を付加する。4 mol の olefine の付加はこの温度で進む。

Na の complex ではさらに不活性になる。NaH と AlEt₃ から得られる Na[AlHET₃] に第 4 の olefine を付加させるのに 160°C の高温を要す¹⁷⁾。

AlH₃ は非常に不安定であるが AlHR₂ になると熱的安定性は大いに増す。AlHMe₂, AlHET₂ は高真空で浴温を 80°C 以上にしないように注意すれば蒸留できる。たとえば AlHET₂ は bp 55~6°/10⁻³~10⁻⁴ mm¹⁷⁾ でこれは AlEt₃ より高い。vapor 中でも dimer ないし trimer に associate しているためである。しかし長く加熱すれば disproportionate する。

AlHR₂ は AlR₃ と違って安定な etherate をつくらない。AlHR₂ の還元力は LiAlH₄ にほぼ近い。後述するがアセチレン結合に cis- 付加をする。ピリジン, キノリンとの complex を水で分解するとピリジン核の還元されたものが得られる。

II. Organoaluminium compound の応用

Aluminium trialkyl の工業的製法が巧みな方法で実現されたのでその合成面に占める意義が大きくなった。まず有機金属化合物合成への利用から記することにする。

1. Boron 化合物 alkylboron 化合物が次の反応で容易につくられる^{22,23)}。

この Ziegler-Köster 法でこれまで単に学問的興味のみに限られていた borontrialkyl が大量に利用できることになった。これまでは Grignard reagent と BF₃ から作るのが一番よい方法とされていた。このほか興味ある方法としては後述するが diborane と olefine を加熱 (通常 100°C 付近) するのがある²⁴⁾。

Boron trialkyl は種々の点で aluminium trialkyl と性質が違っている。aluminium alkyl に見られた触媒反応の多くは borontrialkyl にもってけることができない。ただし stoichiometric の反応の中には boron alkyl にもつくられるものがある。たとえば大きな olefine でもって boron に結合した小さな alkyl 基をおきかえることができる。その小さな alkyl 基は低沸点の olefine として逃げる²²⁾。aluminium alkyl の場合の“追出し反応”に相当する。

Boron の場合には中間に二重結合のある olefine で

も反応するから“追出し反応”の種類が増え各種の boronalkyl がつくれることになる²⁵⁾。

水素による還元では aluminium trialkyl の場合に似て alkyldiborane を生ずる²⁵⁾。

この alkyldiborane は熱的に安定でたとえば B₂H₂Et₄ は常圧で 109~110°C で, B₂H₂(nPr)₄ は常圧で 158~160°C で蒸留される。驚くべき安定さである。金属化合物が存在しなければ disproportionation は簡単にはおこらない。水素による還元をやや強い条件たとえば加圧下 180°C 付近でやれば直接 diborane が得られる²⁵⁾。

この反応はある一定の狭い温度範囲に保たねばならぬこと, 反応に長時間を要するなどの欠点があって実用的でない。還元に amine ことに aliphatic の tert-amine を存在させると, この点は改善される。

生成する BH₃ は NR₃¹ と complex をつくって安定化され, それ以上反応することなく好収率でこの borazane が得られることになる²⁵⁾。Borazane は一般に熱的に安定で蒸留できる。したがって蒸留による borazane の単離精製はらくである。また空気, 湿気に対する抵抗力も B₂H₆ などにくらべ大いに増大している。しかも B-N の結合はさほど強くなってたとえば olefine と 100~150°C に熱すると boron から容易にはずれる。

この反応を利用して興味ある新しい環状 boron 化合物 central boron compound がつくられた (後述)。

Alkyldiborane は alkali あるいは alkaliearth などの金属そのもの, または hydride などで disproportionation され metal boronhydride と borontrialkyl を生ずる。たとえば

Alkali metal boronhydride は衆知のように重要な還元剤である。AlH₃ が LiAlH₄ と安定化されたように MBH₄ も非常に安定で, ことに水中で還元反応を行いうる点有名である。Alkyldiborane にも olefine は容易に付加して mixed borontrialkyl を生ずる。alkyl boron 化合物の面白い性質の一つはこの mixed borontrialkyl を加熱すると往々にして disproportionation がおこって純 alkyl boron 化合物 (同一の alkyl 基のみから成るの意) を生ずることである。たとえば B₂H₂Et₄ と cyclohexene から BEt₃ と B(cyclohexyl)₃ とを生ずる。

2. Silicon 化合物 Silicon halide も boron の場合同様に相当する alkylsilicon を与える²⁰⁾。

このあとの反応で得られる ethyl silicon halide は polyethyl siloxane の製造に用いられる。

3. Zinc alkyl zinc halide との反応は

生成物は蒸留でわけられる。 AlClEt_2 は前述のように今日重要な触媒である。 ZnEt_2 の有効な用途がわかっているときは AlClEt_2 と同時に ZnEt_2 が ton 単位でつくられる点注目すべき反応である²⁰⁾。

4. Aluminium alkylhalide complexes AlEt_3

と NaF の 1:1 の混合を加熱すると $\text{Na}[\text{AlFEt}_2]$, mp 60°C を生ずる。この比を 2:1 にすると組成が $\text{NaF} \cdot 2 \text{AlEt}_3$ に相当する complex を生ず。これは純粋のものは mp $128 \sim 9^\circ\text{C}$ であるが少し不純になると室温で液体である。熱的には比較的不安定で蒸留すると AlEt_3 が留出し $\text{Na}[\text{AlEt}_2\text{F}]$ が残る。したがって後者の complex では Al-Al 結合は強くないことがわかる。両 complex とも電解質であるが 2:1 の complex のほうが強電解質である(次表)。

63°C における抵抗	
$\text{Na}[\text{AlEt}_2\text{F}]$	$2 \times 10^{-4} \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$
$\text{NaF} \cdot 2 \text{AlEt}_3$	$1 \times 10^{-2} \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$

150°C においてはこの値のほぼ 4 倍の電導度を示す。

$\text{Na}[\text{AlEt}_2\text{F}]$ を電解すると cathode に Na を析出する。したがってその構造が前式で表わされることにもなる。 $\text{NaF} \cdot 2 \text{AlEt}_3$ を電解すると cathode には Na を析出しないで Al が析出する。この Al はきわめて純粋でその化学的性質、たとえば酸に対する抵抗は four nine (99.99) の aluminium 以上である²⁶⁾。そして anode には anode として用いた金属の alkyl 化合物を生ずる。たとえば Zn alkyl, Sb alkyl, Pb alkyl などである。このうち興味あるのは PbEt_4 の生成である。Cathode に析出する純粋の aluminium は再び H_2 と ethylene で再び AlEt_3 に転換されるから反応全体として次式で表わすような PbEt_4 の直接合成になる。

5. Magnesium-Aluminium Organic Complex

Ether free の Grignard reagent たとえば EtMgCl を hexane 中で AlEt_3 と 100°C で autoclave を用いて加熱すると $\text{Mg}[\text{AlEt}_4]_2$ が得られる。粘ちょうな液体。これに ether を加えると少し発熱がおこり $\text{AlEt}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ が生成する。これを蒸留で除くと $\text{EtMg}[\text{AlEt}_4]$ を生ずる。相当する methyl aluminium の complex, $\text{MeMg}[\text{AlMe}_4]$ は MgMe_2 と AlMe_3 を hexane 中で熱してつくられる²⁷⁾。また $\text{Mg}[\text{AlMe}_4]_2$ を高真空で加熱すると $\text{MeMg}[\text{AlMe}_4]$, mp 88.5°C , が留出してくる。この熱安定性は興味がある。 $\text{Mg}[\text{AlMe}_4]_2$ は 180°C , 1~2 mmHg で加熱すると分解して MgMe_2 を与える。上の 2 種の Mg-Al-complex はいまのところ実用的な利用は見られない。学問的な興味は Mg-Al-complex が純無機塩の性格の alkali-aluminium alkyl complex, たとえば $\text{Na}[\text{AlR}_4]$ と共有結合的の complex, $[\text{AlMe}_3]_2$ の中間の性質を示す点である。

6. Aluminium trialkyl の空気酸化 Aluminium trialkyl の空気酸化は高収率で alcohol を与える²⁸⁾。

酸化は一般に $(\text{RO})_2\text{AlR}$ の段階になると遅くなる。つまり最後の Al-C 結合は抵抗性を有する。過酸化水素、過酸などで酸化を完結させることができる。この酸化を“組立て反応”と組合せると大い RCH₂CH₂OH がつくられることになる。たとえば工業的に重要な alcohol の一つ 2-ethylhexanol についていえば、次の course が考えられる。

もし butylene から出発するとすれば 3 段階にすぎない。副生するアルミナは高純度のものである。これが特殊な用途に使用されうるならば上の方法は従来の acetylene を原料とし butyraldehyde を経る方法よりはるかに有利となる。その他の応用例として次のような例がある²⁸⁾。

いずれの場合も得られる alcohol は primary alcohol である。Olefine, $\text{RCH}=\text{CH}_2$ に anti-Markonikoff rule にしたがって加水された形になっている点注目されるべきである。

ついでに boron alkyl の酸化についていうと同様に primary alcohol が得られるが収率は通常あまりよくない。(RO)₂BR まで酸化が進むと酸化が進みにくくなる。過酸などで酸化を完結することができる。あるいは注意深くはじめてから過酸で酸化したほうが収率がよい場合がある。Boron 化合物の場合酸化の後処理は加水分解のかわりに無水メタノールで非常に低沸点の B(OMe)₃ を生成させ、methanol との共沸体 (1:1 の沸点は 55~60°C) にして除く。非常に綺麗な反応である。

7. Aluminium trialkyl と CO₂, SO₂ との反応

AlEt₃ と CO₂ との反応は全く予期しない第三アルコールの生成をみる¹⁶⁾。

しかし同時に 2 mol の AlEt₃ を失うことになる。

SO₂ との反応では Sulfin 酸が得られる

8. Aluminium trialkyl と Carbonyl 化合物

Grignard reagent, lithium alkyl は有機合成に広い適用範囲をもっているがその中でも carbonyl 化合物に対する反応が重要な位置を占める。Aluminium alkyl は carbonyl 化合物に対して同様な反応をするが通常それは 3 コの alkyl 基のうち 1 コのみである。

ただ Al(isobutyl)₃ と aromatic aldehyde, ArCHO, あるいは ArCH=CH·CHO, Cl₃CCHO などの場合は 3 mol の aldehyde が反応して Al(OCH₂R)₃ を生ずる²⁹⁾。ことに Cl₃CCHO は AlEt₃ とでも 3 mol 反応する。AlR₂Cl は Grignard reagent と同型の化合物だが AlRCl₂ と共に carbonyl に付加する能力がない¹⁵⁾。有機アルミニウム化合物の独壇場は次に述べる炭素-炭素

不飽和結合に対する付加反応であろう。

9. Aluminium alkylhydride および trialkyl と acetylene Acetylene は ethylene よりすみやかに R₂AlH と反応する。通常 1:1 の付加を行う¹⁵⁾。室温ないし 40°C 付近で反応は進む。

この場合 2:1 の付加物, (R₂Al)₂CHCH₃ あるいは (R₂Al)₂CHCH₂R' が副生するという。末端が 2 つとも置換された acetylene では 1 mol の R₂AlH が付加する。これを水で分解すると純 cis-olefine が得られる¹⁵⁾。たとえば

cis-Olefine を作る一つの有力な武器といえる。

AlR₃ との反応でもはじめ 1:1 の付加物が生成する¹⁵⁾。

この生成物を過剰の AlEt₃ に 120°C でゆっくり加えると 2:1 の付加物 (Et₂Al)₂CHCHEt₂ が生成すると考えられる。なぜならこれを水で分解すると 3-methylpentane CH₃CHEt₂ が得られるから。また上の生成物, Et₂AlCH=CHEt を加熱すると次の反応がおこる。

すなわち上の例では al-R と al-CH=CH- の 2 種の Al-Carbon 結合のうち後者のみが反応に与っている。このことは acetylene を過剰に作用させるときの反応にも見られる。たとえば

水で分解すると 1,2,3,4-tetraethylbutadiene が得られることから上の反応は確められている。Acetylene および monoalkylacetylene では重合がおこり正確なところは分らないが似たような反応がおこっているという。おもしろいのは acetylene が過剰のときも trivinyl 化合物にならないことである。次の反応にはならない。

先に述べた al-CH=CH- の Al-C 結合が al-CH_2- の al-C 結合より反応性に富むことがここでも見られる。

Acetylene が ethylene より反応性に富むことを利用して通常追出し反応がおるために作りにくい次のような olefine をつくることができる¹⁶⁾。たとえば

ただしこの場合、2コの alkyl は利用されずじまいになる。

10. Aluminium Alkyl と Olefine Aluminium trialkyl は ethylene の重合の触媒になり得る。ただし“組立て反応”が $110\sim 130^\circ\text{C}$ でおこるのに対し $150\sim 200^\circ\text{C}$ の高温を必要とする。そして高分子のものは得られない。Propylene 以上の高級 olefine を用いると dimer のみ得られる。またコン跡の Ni が存在するときは ethylene でも butylene を生成するに止まる。この2量化は低温 ($50\sim 60^\circ\text{C}$) で容易に進む。著者の解釈は次のようである。Ni⁰ は AlIII R_3 を不安定なおそらく瞬間的な短時間しか存在しないであろう低級酸化状態、たとえば AlII の complex にもってゆく触媒作用をする。かつ AlII の complex では ligand と Al との結合は弱められていると仮定する(I)。そうだとすると ethylene は容易に AlR 結合にもぐりこむ(II)。ところが

Al-ligand 結合は依然弱く labile である。中でも $\text{Al-C}_2\text{H}_4\text{R}$ は最も弱いであろう。これが butylene としては R_2AlH (III) を残す。このものへの ethylene の付加は 366 ページにも記したが低温でよく進む。したがって(IV)となり再び(I)へ循環する。かくてどんどん butylene が生成してゆくのである。

Ni⁰ と反対の作用をするのが Ti^{IV} である。よく知られているように AlEt_2Cl と TiCl_4 の組合せが Ziegler 法(低圧 polyethylene)の重合触媒の一つである。ただしこの場合 Ti^{IV} は AlIII に対し触媒的な量では不十分である。Ti^{IV} は AlEt_3 によって還元され Ti^{III} と Ti^{II} の混合になる。過剰の AlEt_3 を用いると Ti^{III}:Ti^{II} が

1:1 の比になるという。常に一定の構造をもつとは考えられないが organo-aluminium-titanium-halogen の complex になっているようである²⁰⁾。この混合触媒、あるいは同系統の混合触媒による olefine の重合、ことに isotactic polymerization は目下世界の学会の興味の一中心となっていて多数の報告が出されつつある。わが国でも諸先生方がこのパスに乗り遅れまじと大奮闘である。この分野については別の機会にゆずることにして次にやはり同系統の触媒で達成される butadiene の環化重合について記すことにする。

11. Cyclododecatrine Titanium ester, Ti(OR)₄ と AlEt_3 の混合触媒は ethylene を butene にする³¹⁾が butadiene を 1,2-polybutadiene にすることがわかった³²⁾。Wilke らはさらに他の titanium 化合物と aluminium 化合物の組合せは今度は逆に ethylene を polyethylene にするが, butadiene では主として trimer しか生成しないことを見出した。しかもその trimer は還元, 酸化分解, 赤外スペクトルなどによって trans-trans-cis の cyclododecatrine (1) と推定された³³⁾。

(1)

(2)

さらに, ある種の重金属塩と aluminium 化合物の組合せは(2)と trans-trans-trans cyclododecatrine (2) の混合を与えることがわかった。後者は融点 34°C で室温で, 液体の前者(1)と alcohol の処理でわけられる。また沸点差は 15 mmHg 付近で約 4°C あるから精留でわけられぬことはない。このものの応用について目下 Mülheim で盛んに研究されている。そのうちの一つは C_{12} の lactam あるいは dicarboxylic acid が次の route で合成されることである³³⁾。

Köster と Wilke は borazane の二重結合への付加を利用して非常に興味ある boron 化合物, central boron compound を合成した。

bp $150\sim 160^\circ\text{C}$ の飽和炭化水素を沸点近くに熱しておいて上の2成分を徐々に, そしてできるだけ同じ割合で滴下し, 終れば蒸留する。bp は $131^\circ/16\text{ mm}$ である。

このものは一般の borontrialkyl と同様酸素に対しては敏感であるが olefine に対しては不活性となっている³⁴⁾。この central boron compound の酸化に興味ある 1,5,9-cyclododecantriol が得られる。

11. Aluminium alkyl の熱分解 β 位に枝のある alkyl aluminium は 366 ページに記したように容易に olefine と aluminium dialkylhydride に分解する。たとえば Al(isobutyl)₃ の場合 150°C でこの分解がおこる。

この dialkylhydride は 250°C で徹底的に分解してその成分にもどる。

この分解によって純粋の aluminium が得られる³⁵⁾。Ni を carbonyl にして精製するのと似ている。

おもしろい熱分解は Al(neopentyl)₃ の熱分解である。AlMe₃ に isobutylene を作用させると Al(neopentyl)₃ を生ずる。これを常圧で加熱するとともに成分 AlMe₃ と isobutylene にもどる¹⁰⁾。

この逆反応では methyl 基が C から Al に migrate している。この migration を促しているものは tertiary の C における steric relief が一つであろう。もう一つの factor は Al(neopentyl)₃ は monomer として存在するから Al の sp³ 構造を完成しようとする傾向であろう。この傾向は methyl 基が適当な位置にあることによって助けられる。このことは 365 ページに記した Al₂Me₆ の図で一つの Al を C でおきかえて見ると容易にうなずける。

文 献

- 1) K. Ziegler, H. G. Gellert, *Ann.* **567** 179 (1950)
- 2) K. Ziegler, H. G. Gellert, *Ann.* **567** 195 (1950)
- 3) K. Ziegler, *Angew. Chem.* **64** 323 (1952); *Brennstoff chem* **33** 193 (1952)
- 4) Aluminium trialkyl 合成に関しては次のような総説がある。横田, 化学技術 第2巻第3号 43 (1958); *Ind. Eng. Chem.* **49** 44A (1957)
- 5) K. Ziegler, H. G. Gellert, K. Zosel, W. Lehm-
kul, W. Pfohl, *Angew. Chem.* **67** 424 (1955);
K. Ziegler, *Experientia Suppl.* **II**, S 274 (1955)
- 6) K. S. Pitzer, H. S. Gutowski, *J. Am. Chem. Soc.* **68** 2204 (1946)
- 7) K. Ziegler, R. Köster, *Ann.* **608** 3 (1957)
- 8) P. H. Lewis, R. E. Rundle, *J. Chem. Phys.* **16** 552 (1948)
- 9) A. W. Laubengayer, W. F. Gilliam, *J. Am. Chem. Soc.* **63** 477 (1941)
- 10) K. Ziegler, *Angew. Chem.* **68** 721~9 (1956)
- 11) 未発表; K. Ziegler, H. G. Gellert, *Ann.* **567** 731 (1950) を参照。
- 12) L. O. Brockway, N. R. Davidson, *J. Am. Chem. Soc.* **63** 3287 (1941)
- 13) F. C. Hall, A. W. Nash, *J. Inst. Petrol. Technol.* **23** 679 (1937); **24** 471 (1938)
- 14) K. Ziegler, *Brennstoff chem.* **33** 193 (1952)
- 15) K. Ziegler, *Angew. Chem.* **68** 721 (1956)
- 16) K. Ziegler, E. Holzkamp, *Ann.* **605** 93 (1957)
- 17) K. Ziegler, H. G. Gellert, H. Martin, K. Nagel, J. Schneider, *Ann.* **589** 91 (1954)
- 18) T. Wartik, H. I. Schlesinger, *J. Am. Chem. Soc.* **75** 835 (1953)
- 19) K. Ziegler, *Angew. Chem.* **64** 324 (1952)
- 20) K. Ziegler, *Snomen Kemi.* **A30** 109 (1957)
- 21) E. Wiberg et al., *Z. Naturforsch.* **10b** 229 (1955)
- 22) R. Köster, *Angew. Chem.* **68** 383 (1956)
- 23) R. Köster, *Angew. Chem.* **69** 94 (1957)
- 24) D. T. Hurd, *J. Am. Chem. Soc.* **70** 2053; A. T. Whateley, R. N. Pease, *ibid.* **76** 835 (1954)
- 25) R. Köster, "Pure and Applied Chemistry" Paris 1957
- 26) K. Ziegler, H. Lehmkuhe, *Zeit. f. anorg. u. allgem. Chem.* **283** 414 (1956)
- 27) K. Ziegler, E. Holzkamp, *Ann.* **605** 93 (1957)
- 28) K. Ziegler, K. Krupp, K. Zosel, *Angew. Chem.* **67** 425 (1955)
- 29) K. Ziegler, H. G. Gellert, *Angew. Chem.* **67** 425 (1955)
- 30) G. Wilke, H. Müller, *Ber* **89** 444 (1956)
- 31) H. Martin, *Angew. Chem.* **68** 306 (1956)
- 32) G. Wilke, *Angew. Chem.* **68** 306~7 (1956)
- 33) G. Wilke, *Angew. Chem.* **69** 397 (1957)
- 34) R. Köster,
- 35) K. Ziegler, H. G. Gellert, *Angew. Chem.* **67** 424 (1955)