陰極還元

有機化合物の還元は、具体的には水素と結合する反応と酸素を奪い取る反応がある。これらの反応も対象とする化合物に電子を供与する反応と位置づけられる。この電子供与を電解装置により行うことができる。化合物を電解質に溶かし、陽極と陰極を挿入したのち電位を印加すると、陰極から電解質中の化合物の電子移動が起こり、それに続くプロトン化などの反応によって化合物が還元される。これを電解還元という。また、カソード（陰極）で起きるのでカソード還元、陰極還元とも呼ばれることもある。

たとえば、電子を炭素-炭素二重結合 ($\text{RCH}=\text{CHR}'$) に供与するとアニオンラジカル ($\text{R}\dot{\text{C}}\text{H}\dot{\text{C}}\text{HR}'$) が生成するが、これにプロトンが付加をするとラジカル ($\text{RCH}_2\dot{\text{C}}\text{HR}'$) となる。さらに、電子供与とプロトン付加を繰り返すと、還元体 ($\text{RCH}_2\text{CH}_2\text{R}'$) が生成し、水素付加が起こったと見なすことができる。中間のラジカルアニオン種やラジカル種からいろいろな反応が起こることが可能で、種々の反応が開発されている。

(小倉克之)

antitumor (anticancer) agents

Benign tumors are non-cancerous and generally harmless, whereas malignant tumors are cancerous and their full removal is often difficult or impossible by surgery. Furthermore, malignant tumors may metastasize, spread throughout the body, and cause more tumors to form. To combat cancer surgery antitumor/anticancer agents have been developed. These agents may cure a specific cancer, reduce tumor size, or sensitize tumors to radiation therapy. These agents are typically small molecules and attack cancer by several mechanisms. Some common intracellular targets of anticancer agents are DNA (with cisplatin), microtubule (with taxol), and nuclear hormone receptors (with Tamoxifen). Recently, combination therapy has been shown to be highly effective in treating cancer. This therapeutic method is based on the principle of using multiple drugs that are effective in treating a particular cancer type with different modes of action to act synergistically.

(Brian J. Albert)

十 字 路

Corey-Itsumo 法

ケトンの触媒的不斉還元は非常に重要な化学変換反応である。1981年に、現豊橋科学技術大学の伊津野教授がアミノ酸から導かれる光学活性アミノアルコールとボランとの組み合わせ試薬がケトンを不斉還元することを見出した。これを基にハーバード大学の E. J. Corey 教授が反応機構を明らかにするとともに、実用レベルまで改良を重ねた。現在では、安定な *B*-メチルオキサザボロリジンの *R*, *S* の両エナンチオマーが Aldrich 社から CBS (Corey-Bakshi-Shibata) 試薬として市販されている。またこれらのトルエン溶液も市販されており、実験者はこれに基質のケトンと市販のボラン THF 溶液を加えるだけの簡単な操作で、不斉の2級アルコールを光学純度よく得ることができる。カルボニル基の左右に位置する置換基のサイズおよび電子的な環境に基づき、不斉オキサザボロリジン試薬がカルボニル基のプロキラルな面を認識するのが原理である。従って、すべてがパーフェクトであるわけではないが、他の不斉還元試薬に比較して、簡便性、高い一般性などの点で群を抜いて優れており、有機合成化学におけるケトンの実用的な触媒的還元方法といえる。詳細は Corey 教授自身による総説 [Angew. Chem. Int. Ed., 37, 1986(1998)] に詳しく記載されている。

(上西潤一)

フォルダマー

鎖状の骨格を持つ有機化合物において、分子全体あるいは一部分が自発的に折りたたまれ、特定の安定したコンホメーションをとることをフォールディング (folding) といい、そのような現象を示す分子 (低分子からポリマーまで含む) をフォルダマー (foldamer) と呼ぶ。タンパク質は代表的なフォルダマーであり、ポリペプチドのフォールディングによって、 α ヘリックスや β シートといった二次構造およびそれらを特定の場所に配置した三次構造が形成される。

一般にフォルダマーは折りたたまれることで構造が密になり、互いに結合が離れた官能基でも空間的に近接させることができる。タンパク質などでは、これによって特異的な機能発現が促されている。

フォールディングの駆動力となるのは、主に分子内における水素結合や π - π スタッキング、ファンデルワールス力などの弱い相互作用である。駆動力の種類によっては、温度、溶媒、共存分子などの外部環境が折りたたみ構造の形成と安定性に大きく影響する。

近年では人工のフォルダマーも多数報告されており、生体模倣物質や機能性材料のビルディングブロックとしても期待されている。

(榎 飛雄真)